

NICARÁGUA

Leishmaniose cutânea e mucosa 2017

Incidência
(100.000 hab.) **140,0**

Transmissão
Índice Composto de
Leishmaniose Triênio
(ICLTc 2015-2017) **Muito
Intenso**

Ocorrência


4343

NOVOS CASOS


4098 cutâneas (94,4%)

39 mucosas (0,9%)

206 não especificado
(4,7)



ICLTc triênio
(2015-2017)



GRUPO DE IDADE

13% < 5 anos
13,5% ≥ 5 < 10 anos
73,5% > 10 anos

26,5% crianças
menores de 10 anos



SEXO

58,1% Masculino
41,9% Feminino

45,2% homens a
cima de 10 anos



FRONTEIRAS

Fronteira com **2** países
em **26** municípios

30,8% dos casos nas
fronteiras



VIGILÂNCIA E CONTROLE

48,5% da população
em áreas de transmissão

Diminuição % de LC
em menores de 10 anos
em comparação à linha de
base de 2012-2015 (Meta
do Plano de Ação).



ESPÉCIES DE LEISHMANIA

L. braziliensis
L. panamensis
L. infantum



VETORES LUTZOMYIA

L. panamensis
L. trapidoi
L. ylephiletor
L. cruciata
L. longipalpis
L. evansi



ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

Diagnóstico de laboratório:
94,2%

Cura clínica: **94,96%**

% Pacientes curados entre
tratados: **S/I**



MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS

Antimoniato de
Meglumina